



Kaišiadorių rajono agentūros specialistai 2012 m. vasario 20 d. patikrino ežeruose bei tvenkiniuose deguonies kiekį. Ledo storis vandens telkiniuose siekia 30 – 40 centimetrų.

Nustatyta:

1. Kiemelių ežere deguonies 9,65 mg O₂/l, vandens temperatūra – 1,7 °C;
2. Girelės tvenkinyje deguonies 9,43 mg O₂/l, vandens temperatūra – 1,8 °C;
3. Ščebnicos tvenkinyje deguonies 9,82 mg O₂/l, vandens temperatūra – 1,8°C;
4. Tryliškių tvenkinyje deguonies 6,4 mg O₂/l, vandens temperatūra – 2,7 °C;
5. Žiežmarių girininkijos tvenkinyje deguonies 4,77 mg O₂/l, vandens temperatūra – 3,7 °C;

Pavojus žuvims negresia

Parašė krd.am.lt

Penktadienis, 24 Vasaris 2012 20:46

Esant deguonies koncentracijai mažiau nei 2 mg/l, žuvis pradeda dusti. Kaip matyti deguonies kiekis yra mažesnis mažuose ir sekliuose tvenkiniuose į kuriuos mažas vandens padavimas ir išbėgimas. Pavojaus dusimui kol kas nėra, prasideda atlydžiai, pradeda tirpti sniegas, pradės vykti fotosintezė, gaminsis deguonis.

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas