

Lakys (Polymitarcis virgo) . Liaudiškai dar vadinami krokodilais. Puikus masalas gaudant žiemą nuo ledo. Žvejų pastebėjimas - smulkmė nelabai jais domisi.Susigundo stambesnės.


L a š a l ų (E p h e m e r o p t e r a) b ū r y s Suaugę vabzdžiai būna 0,4 – 5,0 cm dydžio, labai ilgomis priekinėmis kojomis. Sparnai plėviški, tankiai gysloti, priekiniai gerokai didesni už užpakalinius (pastarųjų gali ir visai nebūti). Pilvelio gale yra trys (kartais du) ilgi uodegos cerkai – siūliškos ataugos kūno gale.

Skraido vakarais ar naktį netoli vandens. Suaugę lašalai nesimaitina, gyvena labai trumpai – nuo kelių valandų iki kelių dienų, tiek, kiek reikia laiko kiaušiniams padėti. Didžiąją gyvenimo dalį – iki trejų metų – praleidžia vandenyje, lervos stadijoje.


Lervų kūno forma labai įvairi, priklauso nuo gyvenimo sąlygų ir būdo. Srauniose upėse gyvenantys lašalai – plokšti, dumble gyvenančios ar laisvai plaukiojančios ramesnėse vietose lervos – cilindriškos. Kvėpuoja lapelių, siūlelių ar kitokio pavidalo žiaunomis. Nuo kitų vandenyje gyvenančių panašių lervų lengvai skiriasi tuo,
jog kūno gale, kaip ir suaugę lašalai, turi tris siūlo pavidalo ataugas – cerkus. Lašalų lervų galime aptikti tiek upėse, tiek ir ežeruose.

Labiau mėgsta švarius vandenis ir todėl yra geras užterštumo rodiklis. Lašalų lervos minta dumbliais, organinės medžiagos liekanomis, pasitaiko ir plėšrių. Antra vertus, pačios lašalų lervos yra geras maisto šaltinis kitiems vandens gyvūnams. Lietuvoje galime aptikti apie 70

lašalų rūšių.



Lašalų (*Ephemeroptera*) būrio atstovai:
a – geltonasis lašalas (*Potamanthus luteus*);
b – tikrasis lašalas (*Ephemera sp.*) imago;
c – tikrasis lašalas (*Ephemera sp.*) lerva;
d – mažagyslis lašalas (*Oligoneuriella sp.*)



Lašalų priekinė kūno dalis:
a – lakys (*Polymitarcis virgo*);
b – *Ephemera vulgata*