

Salatis (*Aspius aspius*) 1758m.

Parašė Titas

Trečiadienis, 13 Vasaris 2013 15:20



Salačio kūnas verpstės formos iš šonų plokščias. Nugara melsvai pilka, šonai sidabriški, pilvas baltas. Pelėkai pilki, uodeginis ir nugarinis pelekai tamsiais galais, analinis, krūtininis ir pilvinis pelekai ties pamatais rausvi. Žvynai smulkūs, žiotys plačios, apatinis dalis šiek tiek atsikišęs į priekį. Labai panasus i didžiulę aukšlę.

Salatis yra plėšri žuvis. Dėl to salačio žiotys plačios; apatinio žando susinėrimas su kaukole užaina net už statmens, išvesto per akies vidurį, o, be to, apatinis žandas atsikišęs į priekį. Uodeginis pelekas giliai iškirptas. Vidutinis salačių ilgis (neskaitant uodeginio peleko) – 40 – 60 cm, svoris – 1 – 4 kg. Neryje retkarčiais pasitaiko net didesnių kaip 10 kg svorio. Paplitęs upėse, įtekančiose į Šiaurės ir Baltijos jūras. Lietuvoje dažnas Nemune, Neryje, Šventojoje, Merkyje ir kitose didesnėse upėse, taip pat Kuršių mariose ir Krokų Lankos ežere.

Ketverių metų esti 25-30 cm, 300-450 g. Subręsta 4-5 metų, neršia balandžio mėnesį, kai vandens temperatūra 9-10°C, ant akmenuoto ar žvirgždėto dugno, sraunumose ir rėvose. Embrionai vystosi 6-8 paras. Jaunikliai minta bestuburiais, vabzdžiais, suaugę plėšrūs, gaudo smulkesnes žuvis, bet nevengia ir vabzdžių.

Oficialus užregistruotas Lietuvos rekordas – 6 kg salatis, kurį 1988 metais Nemune sugavo alytiškis Stasys Granauskas. IGFA rekordas – 5,66 kg salatis. Jį 1993 metais Vanern ežere (Švedija) sugavo Jan-Erik Skoglund.

Ne kiekvienas Lietuvos meškeriotojas pažįsta šią žuvį. Ežeriniai žūklautojai tiesiog negali su juo

Salatis (*Aspius aspius*) 1758m.

Parašė Titas

Trečiadienis, 13 Vasaris 2013 15:20

susitikti – salatis, dažniau šelviu vadinamas – tipiškas upių gyventojas. Užtvenkus Nemuną, Šventają, Jūrą, salačių liko naujuose tvenkiniuose, prisitaikė gyventi stovinčiuose vandenyse. Tačiau daugiausia jų yra didžiausiose mūsų upėse: Nemune, Neryje, Šventojoje. Gyvena jie pratakiose ežeruose, didesniuose karjeruose prie upių, kurie potvynių metu susijungia su upės srautais.



Pramoninėje žūklėje salatis teturi antraeilę reikšmę, bet užtat sportinėje žūklėje yra labai vertinamas kaip sunkiai pagaunama žuvis, ir jo gaudymas teikia meškeriotojui malonių išgyvenimų. Meškerioti salatį galima pradėti nuo gegužės mėnesio, bet intensyviausiai jis gaudomas nuo liepos mėnesio iki rugsėjo pabaigos. Salatis meškeriojamas dieną paprastai tuo momentu, kada jis medžioja, t. y. kai pasigirsta stiprūs jo smūgiai vandens paviršiuje. Salatis meškeriojamas upės sraunumose, prie rėvų, vandens sūkuriuose, t. y. salačio mėgstamose vietose. Masalas užmetamas į tą vietą, kurioje salatis tik ką yra smogęs uodega į vandenį. Masalas turi būti traukiamas kiek galima arčiau vandens paviršiaus arba tiesiog paviršiuje.

Salatis (*Aspius aspius*) 1758m.

Parašė Titas

Trečiadienis, 13 Vasaris 2013 15:20



Salatis (*Aspius aspius*) 1758m.

Parašė Titas

Trečiadienis, 13 Vasaris 2013 15:20

